

Kalendarz oprysków czereśni

31

Monitoring nasionnicy, orientacyjne terminy ochrony, dziennik żółtych tablic, plan karencji i checklista warunków bezpiecznego zabiegu.

Najważniejsza zasada

Nie wyznaczaj oprysku wyłącznie na podstawie daty. Decyzję oprzyj na regularnych odłowach muchówek, pogodzie, fazie dojrzewania owoców oraz aktualnej etykiecie środka dopuszczonego do stosowania w czereśni.

1

Monitoruj

Zawieś żółte tablice w drugiej połowie maja i kontroluj je najlepiej co 2-3 dni.

2

Działaj przed larwami

Zabieg ma ograniczyć dorosłe muchówki, zanim złożą jaja pod skórą owoców.

3

Pilnuj karencji

Ostatni zabieg musi być wykonany odpowiednio wcześniej przed planowanym zbiorem.

5 etapów sezonu

dziennik odłowów

plan dla kilku odmian

checklista pogody

karta karencji

Poradnik nie wskazuje konkretnego preparatu ani dawki. Zakres zastosowania, odstęp między zabiegami, maksymalną liczbę aplikacji, karencję i warunki wykonania oprysku zawsze sprawdź na aktualnej etykiecie środka.

Kiedy obserwować, a kiedy rozważyć zabieg?

Podane terminy są orientacyjne. Ciepła wiosna może przyspieszyć wylot nasionnicy, a chłodna pogoda może go opóźnić.

Druga połowa maja

Początek monitoringu

Obserwuj: pierwsze muchówki na żółtych tablicach, wzrost temperatury i początek dojrzewania owoców.

Działanie: zawieś pułapki w nasłonecznionej części korony na wysokości około 1,5-2 m. Kontroluj je co 2-3 dni i zapisuj wyniki.

Przełom maja i czerwca

Możliwy pierwszy zabieg

Obserwuj: regularne odłowy i wyraźny wzrost liczby muchówek.

Działanie: rozważ pierwszy oprysk kilka dni po rozpoczęciu regularnych odłowów, zgodnie z etykietą preparatu.

Pierwsza połowa czerwca

Największe zagrożenie

Obserwuj: nasilony nalot oraz owoce zmieniające kolor z zielonego na żółtawy.

Działanie: szczególnie uważnie kontroluj odmiany średnio późne. Ochrona powinna przypadać przed masowym składaniem jaj.

Druga połowa czerwca

Odmiany późne

Obserwuj: dalsze odłowy, późne odmiany i możliwą obecność muszki plamoskrzydłej.

Działanie: przed kolejną aplikacją sprawdź liczbę dopuszczonych zabiegów, odstęp między nimi i karencję.

7-14 dni po zabiegu

Ocena potrzeby powtórzenia

Obserwuj: utrzymujący się nalot, ponowny wzrost odłowów i dalsze dojrzewanie owoców.

Działanie: zabieg uzupełniający rozważ tylko wtedy, gdy etykieta pozwala na ponowne użycie i nadal występuje realne zagrożenie.

Nie powtarzaj oprysku automatycznie po 7, 10 ani 14 dniach. Właściwy odstęp zależy od konkretnego środka i zapisów na jego etykiecie.

Kontrola żółtych tablic

Notuj datę, liczbę muchówek, pogodę i fazę owoców. Seria zapisów pomaga odróżnić pojedynczy odlów od początku regularnego nalotu.

Data	Liczba owadów	Pogoda z ostatnich dni	Faza / kolor owoców	Uwagi

Porównanie kilku drzew lub odmian

Odmiana / drzewo	Termin dojrzewania	Pierwszy regularny odlów	Data zabiegu	Planowany zbiór

Odmiany późne pozostają podatne dłużej. Nie oceniaj zagrożenia dla wszystkich drzew wyłącznie na podstawie jednej pułapki.

Checklista pogody i warunków oprysku

Odznacz punkty dopiero po sprawdzeniu aktualnej prognozy i wymagań podanych na etykiecie konkretnego preparatu.

☐**Brak deszczu**

Po zabiegu preparat musi mieć czas na wyschnięcie lub pobranie przez roślinę.

☐**Niewielki wiatr**

Na terenie otwartym prędkość wiatru nie może przekraczać 4 m/s.

☐**Umiarkowana temperatura**

Nie opryskuj podczas upału, przymrozku ani gwałtownej zmiany temperatury.

☐**Małe nasłonecznienie**

Najczęściej wybiera się poranek lub wieczór, zgodnie z etykietą.

☐**Suche liście i owoce**

Rosa albo wcześniejszy deszcz mogą rozcieńczyć ciecz i pogorszyć przyczepność.

☐**Brak aktywności pszczoł**

Wykonuj zabieg po zakończeniu oblotu i sprawdź kwitnące chwasty pod drzewem.

☐**Stabilna pogoda po zabiegu**

Nie planuj oprysku tuż przed burzą ani przy porywistym wietrze.

☐**Etykieta przeczytana**

Sprawdź dawkę, ilość wody, ochronę osobistą, prewencję i liczbę zabiegów.

Dane planowanego zabiegu

Nazwa preparatu:

Szkodnik z etykiety:

Dawka / ilość wody:

Maks. liczba zabiegów:

Odstęp między zabiegami:

Wymagane środki ochrony:

Większa dawka nie oznacza lepszej ochrony. Nie przekraczaj dawki ani maksymalnej liczby zastosowań podanej na etykiecie.

Karta karencji i decyzji o kolejnym zabiegu

Najwcześniejsza data zbioru

Data ostatniego oprysku + pełna liczba dni karencji podana na etykiecie.

Obliczenie karencji

Data oprysku: _____

Karencja: _____

Najwcześniejszy zbiór: _____

Planowany zbiór: _____

Czy rozważyć powtórzenie?

- ☐ Muchówki nadal regularnie pojawiają się na tablicach.
- ☐ Liczba odłowów ponownie wzrasta.
- ☐ Owoce nadal dojrzewają.
- ☐ Minął odstęp z etykiety.
- ☐ Etykieta dopuszcza kolejną aplikację.
- ☐ Można zachować pełną karencję.
- ☐ Pogoda pozwala wykonać zabieg.

Jeżeli do planowanego zbioru pozostało mniej dni, niż wynosi karencja preparatu, nie stosuj tego środka. Samo umycie owoców nie skraca karencji.

Notatki na sezon

Materiał ma charakter pomocniczy. Stosuj wyłącznie środki aktualnie dopuszczone do ochrony czereśni przeciwko konkretnemu szkodnikowi. Przed każdym zastosowaniem przeczytaj aktualną etykietę i sprawdź oficjalny rejestr środków ochrony roślin.